



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

DLP 14-11-01009604

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n° 12 du 25 avril 2000 - 1 page - Numéro ordre postal : 22

FLASH SPECIAL MALADIES

septoriose - rouille jaune - sclérotinia

Blé

- les pluies importantes de ce week end ont été fortement contaminatrices au niveau de la septoriose. Le risque annoncé par le modèle PRESEPT est désormais élevé sur quasiment tous les postes de la région.

Les parcelles ayant atteint le stade 2 noeuds n'ayant pas encore reçu de matières actives efficaces contre la septoriose (triazole ou triazole + strobilurine), doivent être rapidement mises sous protection.

- un foyer de rouille jaune a été détecté en fin de semaine dans le nord de la Seine et Marne, à Ussy / Marne, sur la variété AUDACE. Des foyers sont également présents en Picardie, sur TREMIE notamment.

La rouille jaune se présente sous forme de pustules jaune citron, alignés sur 2 ou 3 rangées (alors que les pustules de rouille brune, plus orangés, sont dispersés sur l'ensemble du limbe. Sous les lignes de pustules de rouille jaune, la feuille est nécrosée. Le développement de cette maladie était prévisible comme nous l'avions déjà souligné, compte tenu de l'inoculum présent depuis les attaques de l'an dernier, et des conditions humides et fraîches depuis la reprise de végétation. Les spores de rouille jaune étant très sensibles aux ultraviolets, la maladie reste généralement sous forme de foyers plus ou moins importants. Les essais de l'an dernier ont confirmé sa forte nuisibilité comme pour la rouille brune (de 10 à plus de 30 qx / ha)

Surveillez bien vos parcelles, surtout dans les secteurs ayant subi des attaques sévères en 99 (Val d'Oise, Yvelines). Parmi les variétés les plus sensibles : VICTO, TREMIE, AZTEC, COURTOT, RECITAL, TALDOR, TEXEL,...

Attention en 99, des variétés prétendues tolérantes ont vu leur résistance contournée,

comme BALTIMORE - BALTAZAR - MERCURY....

Il est nécessaire d'intervenir dès l'apparition de pustules dans la parcelle avec une triazole seule ou avec strobilurine. L'hexaconazole semble la matière active la plus curative.

Colza

Comme pour la septoriose, le risque sclérotinia est maintenant assez important. Il convient d'appliquer très rapidement le fongicide. A noter que les imides (ex CALIDAN) ont une action curative de quelques jours.

Pois

La forte humidité des sols peut déjà laisser craindre des problèmes d'aphanomyces.

Service Régional de la
Protection des
Végétaux
ILE DE FRANCE
10 rue du séminaire
94516 RUNGIS cedex
Tel : 01-41-73-48-00
Fax : 01-41-73-48-48

Imprimé à la station
D'Avertissements
Agricoles de Rungis
Directeur gerant :
J. BOULUD

Publication périodique
C.P.P.A.P.
n°0904 B 00536
ISSN n°0767-5542

Tarif Courrier 360 F
Fax 435 F



784